









SPW Editions

# Clé générale




Clef générale

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Nageoire dorsale ordinaire  |  |   |
| Présence de barbillons  | Longue nageoire anale  | Absence de barbillon; nageoire anale ordinaire                                      |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Présence d'une nageoire adipeuse  | Double nageoire dorsale  | Longue nageoire dorsale   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Poisson très allongé (comme un serpent)   | Nageoire dorsale disposée à l'arrière  | Petite nageoire dorsale   |



Nageoire dorsale ordinaire

Présence  
de barbillons

Longue  
nageoire anale

Absence de barbillon;  
nageoire anale  
ordinaire

*Tinca tinca*

Tanche



corps verdâtre

flancs jaune doré

2 barbillons

25 à 50 cm



*Gobio gobio*

Goujon



2 barbillons


nageoires zébrées

8 à 16 cm

*Alburnus alburnus*

Loche franche







Nageoire dorsale ordinaire

Présence  
de barbillons

Longue  
nageoire anale

Absence de barbillon;  
nageoire anale  
ordinaire

*Abramis brama*

**Brème commune**



corps aplati  
latéralement



a b  
a > b

25 à 60 cm

*Blicca bjoerkna*

**Brème bordelière**



a b  
a = b

15 à 20 cm



Nageoire dorsale ordinaire

Présence  
de barbillons

Longue  
nageoire anale

Absence de barbillon;  
nageoire anale  
ordinaire

*Alburnoides bipunctatus*

**Ablette spirilin**



8 à 12 cm

*Alburnus alburnus*

**Ablette commune**



12 à 16 cm



Nageoire dorsale ordinaire

Présence  
de barbillons

Longue  
nageoire anale

Absence de barbillon;  
nageoire anale  
ordinaire

*Rutilus rutilus*

**Gardon (Rousse)**



nageoires dorsale et ventrales  
au même niveau

yeux rougeâtres



10 à 36 cm

*Scardinius erythrophthalmus*

**Rotengle**



nageoire dorsale plus en  
arrière que les ventrales

yeux orangés



10 à 25 cm



*Leuciscus cephalus*

**Chevaine (Chevesne)**



grande bouche

corps arrondi



nageoire anale convexe

30 à 60 cm

*Phoxinus phoxinus*

**Vairon**



écailles peu visibles



4 à 10 cm





*Chondrostoma nasus*

**Hotu**



museau proéminent

25 à 48 cm

*Leuciscus leuciscus*

**Vandoise**



nageoire anale concave

18 à 28 cm



Nageoire dorsale ordinaire

Présence  
de barbillons

Longue  
nageoire anale

Absence de barbillon;  
nageoire anale  
ordinaire

*Leuciscus idus*

**Ide mélanote**



grande bouche

30 à 50 cm

*Aspius aspius*

**Aspe**



mâchoire inférieure plus  
grande que la supérieure

40 à 110 cm



Présence d'une nageoire adipeuse

*Salmo trutta fario*

**Truite fario**



robe à points rouges et noirs

20 à 50 cm

*Oncorhynchus mykiss*

**Truite arc-en-ciel**



bande rose irisée

20 à 50 cm

*Salmo trutta trutta*

**Truite de mer**



robe argentée à points noirs en forme de croix

30 à 100 cm

*Thymallus thymallus*

**Ombre**




nageoire dorsale en forme de drapeau (haute et bariolée)

petite bouche

20 à 45 cm

*Salmo salar*

**Saumon atlantique**



nageoire caudale échancrée

50 à 100 cm



*Perca fluviatilis*

**Perche**



rayons épineux

tache noire



25 à 50 cm

*Stizostedion luciperca*

**Sandre**



rayons épineux

pas de tache noire



dents de taille irrégulière

35 à 80 cm

*Gymnocephalus cernua*

**Grémille**



nageoires dorsales fusionnées



10 à 15 cm

*Gasterosteus aculeatus*

**Epinoche**



trois épines dorsales



6 à 10 cm

*Lepomis gibbosus*

**Perche-soleil**



nageoires dorsales fusionnées



corps comprimé latéralement

10 à 20 cm

*Cottus gobio*

**Chabot**



très grosse tête

opercule épineux



8 à 15 cm



Longue nageoire  
dorsale

*Cyprinus carpio*

**Carpe**



4 barbillons

20 à 100 cm

*Carassius carassius*

**Carassin**



absence  
de barbillons

15 à 30 cm

*Rhodeus sericeus amarus*

**Bouvière**



ligne latérale  
interrompue

5 à 9 cm



Poisson très allongé  
(comme un serpent)

*Anguilla anguilla*

**Anguille**



très longue  
nageoire dorsale



40 à 100 cm

*Lampertra planeri*

**Petite lamproie**



bouche en forme de ventouse



10 à 20 cm



Nageoire dorsale  
disposée à l'arrière.

Esox lucius

## Brochet



museau plat et large  
(« bec de canard »)



40 à 120 cm

